

KÖDER

Производственной компании KÖDER
127540 | Москва | Керамический п-д, 49к1, оф.2 |
Тел.: 8 (800) 222 94 92
Моб.: 8 (903) 611-39-67
Моб.: 8 (962) 949-00-05
www.derkoder.ru

ИНСТРУКЦИЯ ASSIST, КЭ 25%

Средство представляет собой жидкость светло-желтого цвета, содержит в качестве действующего вещества (ДВ) пиперонил бутоксид (25%) комплекс ПАВ, адьюванты и растворители.

Средство рекомендуется применять совместно с инсектицидами, содержащими пиретроиды, в помещениях на объектах различных категорий. Для препаратов Ципакс (25% циперметрина) и Димигран (5% циперметрина, 50% хлорпирифоса и 1% дифлубензурана)

рекомендуется следующие концентрации препарата ASSIST:

Для ЦИПАКСА		Для ДИМИГРАНА	
Вода	945мл	Вода	970мл
Ципакс	5мл	Димигран	10мл
ASSIST	50мл	ASSIST	20мл

Препарат может смешиваться с любыми пиретроидными инсектицидом.

Устойчивость рабочего раствора проверяется, предварительно смешав в небольшой емкости инсектицид и ASSIST в планируемой пропорции.

Assist рекомендуется применять в соотношении от 1к1 или 10 к 1 к содержанию пиретроида в препарате.

Меры предосторожности:

При работе со средством следует использовать индивидуальную защитную одежду (комбинезон, резиновые сапоги) и средства индивидуальной защиты: кожи рук - резиновые перчатки, глаз - герметичные очки, органов дыхания - респираторы универсальные с противогазовым патроном марки «А» («РУ 60 М», «3М», «РПГ67»)

Меры первой помощи:

При попадании на кожу удалить средство ватным тампоном, ветошью не втирая, затем промыть загрязненный участок водой с мылом. При попадании в глаза



KÖDER

Производственной компании KÖDER
127540 | Москва | Керамический п-д, 49к1, оф.2 |
Тел.: 8 (800) 222 94 92
Моб.: 8 (903) 611-39-67
Моб.: 8 (962) 949-00-05
www.derkoder.ru

следует обильно промыть их под струей воды или 2% раствором пищевой соды в течение нескольких минут, при появлении раздражения слизистой оболочки глаз закапать 30% раствор сульфида натрия. При ингаляционном отравлении, вывести пострадавшего на свежий воздух, снять загрязненную одежду, прополоскать рой и нос водой или 2% раствором пищевой соды. При случайном попадании в желудок выпить 1-2 стакана воды с активированным углем (10-15 табл.) Не вызывать рвоту и не вводить ничего в рот человеку, потерявшему сознание. После оказания первой помощи обратиться к врачу.

В аварийной ситуации:

При случайной утечке средства необходимо засыпать его сорбирующим материалом (ветошь, опилки, силикагель), тщательно собрать в специальную емкость и вместе с тарой отправить на утилизацию. Загрязненный участок обработать кашицей хлорной извести (1кг на 10 л воды), затем вымыть водой. Все работы проводить с использованием спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Условия транспортировки:

Транспортирование допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Условия хранения:

Средство хранят в упаковке Изготовителя в сухом, закрытом складском помещении, вдали от источников огня, нагревательных приборов и солнечного света, местах не доступных для детей и домашних животных, отдельно от пищевых продуктов и лекарственных средств, при температуре от 0 до +30 градусов по Цельсию.

Меры защиты окружающей среды:

Не допускать попадания не разбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и канализацию.



ПРЕПАРАТ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНСЕКТИЦИДОМ И НЕ ПОДЛЕЖИТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ.